

ラタプロスト点眼液0.005%「わかもと」

を使用されている方へ

この目薬は、緑内障・高眼圧症治療薬です。
医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。

5mL容器に2.5mLの薬液が入っているため、
量が少なく見えます。



点眼のしかた

- 点眼する前には手をきれいに洗いましょう。
- 1日1回1滴** 点眼してください。
(1日1回 を超えて点眼しないでください。)
点眼するとき、容器の先端が目、まぶた、まつ毛に
触れないように注意してください。




<点眼し忘れた場合>

- ・その日のうちであれば、すぐに1回分を点眼してください。
- ・翌日に気づいた場合は、前日の分は点眼せず、通常どおり1日1回1滴
点眼してください。
- 点眼後、目からあふれた目薬は、ぬらしたティッシュ等ですぐにふき取るか、目を閉じて洗顔してください。(目からあふれた薬液をそのままにしておくと、まぶたが黒ずんだり、まつ毛が濃く、太くなったりすることがあります。)
- 点眼後は静かにまぶたを閉じ、1～5分間、目頭を軽く押さえてください。(薬液が鼻や口などに流れるのを防ぎます。)
- 他の目薬も併用する場合には、5分以上の間隔をあけてから点眼してください。
- コンタクトレンズを装着している場合は、レンズを外して点眼し、15分以上経過してからレンズをつけてください。



保存のしかた

- 開封前は、投薬袋に入れて、冷蔵庫(2～8℃)で保存してください。
- 開封後は、投薬袋に入れて、光を避け、室温(1～30℃)で保存できます。(冷蔵庫での保存も可能です。)
- 開封後は、1ヵ月以内に使用してください。



点眼後の注意

- 瞳の色が濃くなる、まつ毛が伸びる、目のまわりの黒ずみやうぶ毛が濃くなる場合があります。
- しみる、かゆみ、痛みなどの異常が持続する場合は、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。
- 点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には機械類の操作や自動車等の運転は控え、症状が回復してから行うようにしてください。
- その他点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

毎日忘れずに点眼しましょう。

医療機関名



わかもと製薬株式会社