

# うらちも配合点眼液「ニッテン」

を使用されている方へ

この目薬は、緑内障・高眼圧症治療薬です。  
医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。

5mL容器に2.5mLの薬液が入っているため、  
液量が少なく見えます。



## 点眼のしかた

- 点眼する前には手をきれいに洗いましょう。
- 1日1回1滴** 点眼してください。  
(1日1回 を超えて点眼しないでください。)  
点眼するとき、容器の先端が目、まぶた、まつ毛に  
触れないように注意してください。



### <点眼し忘れた場合>

- ・その日のうちであれば、すぐに1回分を点眼してください。
- ・翌日に気づいた場合は、前日の分は点眼せず、通常どおり1日1回1滴  
点眼してください。

- 点眼後、目からあふれた目薬は、ぬらしたティッシュ等ですぐにふき取るか、目を閉じて洗顔してください。(目からあふれた薬液をそのままにしておくと、まぶたが黒ずんだり、まつ毛が濃く、太くなったりすることがあります。)

- 点眼後は静かにまぶたを閉じ、1～5分間、目頭を軽く押さえてください。(薬液が鼻や口などに流れるのを防ぎます。)


- 他の目薬も併用する場合には、5分以上の間隔をあけてから点眼してください。

- コンタクトレンズを装着している場合は、レンズを外して点眼し、15分以上経過してからレンズをつけてください。



## 保存のしかた

- 開封前は、投薬袋に入れて、冷蔵庫(2～8℃)で保存してください。
- 開封後は、投薬袋に入れて、室温(1～30℃)で保存することもできます。(冷蔵庫での保存も可能です。)
- 開封後は、1ヵ月以内に使用してください。



## 点眼後の注意

- 以下のような症状がある場合には、医師または薬剤師にご相談ください。
  - ・まつ毛が伸びる
  - ・目のまわりが黒ずむ
  - ・瞳の色が濃くなる
  - ・充血、目の痛み、刺激、異物感
  - ・息切れ、息苦しさ
  - ・脈が乱れる
  - ・目のまわりの腫れや赤み、かゆみなど
- その他点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

**毎日忘れずに点眼しましょう。**

医療機関名



**わかもと製薬株式会社**