


ブリンモニジン酒石酸塩点眼液0.1%「わがもと」 を使用されている方へ

この目薬は、緑内障・高眼圧症治療薬です。
医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。



点眼のしかた

- 点眼する前には手をきれいに洗いましょう。
- 1日2回、1回1滴** 点眼してください。
点眼するとき、容器の先端が目、まぶた、まつ毛に
触れないように注意してください。



<点眼し忘れた場合>

- ・気がついたとき、すぐに1回分を点眼してください。
- ・ただし、次に点眼する時間が近い場合には忘れた分は点眼せず、次の点眼時間に1回分を点眼してください。

- 点眼後、目からあふれた目薬は、ぬらしたティッシュ
等ですぐにふき取ってください。
- 点眼後は静かにまぶたを閉じ、1～5分間、目頭を
軽く押さえてください。(薬液が鼻や口などに流れる
のを防ぎます。)
- 他の目薬も併用する場合には、5分以上の間隔を
あけてから点眼してください。



保存のしかた

- 投薬袋に入れて、室温(1～30℃)で保存してください。
- 開封後は、1ヵ月以内に使用してください。

点眼後の注意

- この目薬を使っている間は眠気、めまい、目のかすみなどが起こることがあります。自動車の運転など危険を伴う機械の操作には十分注意してください。
- 点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

毎日忘れずに点眼しましょう。

医療機関名



わかもと製薬株式会社