

タフチモ配合点眼液「日点」

を使用されている方へ

この目薬は、緑内障・高眼圧症治療薬です。

医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。

次の人は、本剤を使用することはできません。

- ◆過去に本剤に含まれる成分で過敏症のあった方
- ◆気管支喘息、または過去に気管支喘息と診断された方、気管支痙攣、重篤な慢性閉塞性肺疾患のある方
- ◆コントロール不十分な心不全、洞性徐脈、房室ブロック(Ⅱ、Ⅲ度)、心原性ショックのある方
- ◆オミデネパグ イソプロピル(エイベリス点眼液)を使用している方



点眼のしかた

●点眼する前には手をきれいに洗いましょう。

●**1日1回1滴** 点眼してください。

(1日1回1滴を超えて点眼しないでください。)

点眼するとき、容器の先端が目、まぶた、まつ毛に触れないように注意してください。

＜点眼し忘れた場合＞

- ・その日のうちであれば、すぐに1回分を点眼してください。
- ・翌日に気づいた場合は、前日の分は点眼せず、通常どおり1日1回1滴点眼してください。

●点眼後、目からあふれた目薬は、ぬらしたティッシュ等ですぐにふき取るか、目を閉じて洗顔してください。(目からあふれた薬液をそのままにしておくと、目のまわりが黒ずんだり、まつ毛が長く、太く、多くなったりすることがあります。)

●点眼後は静かにまぶたを閉じ、1～5分間、目頭を軽く押さえてください。(薬液が鼻や口などに流れるのを防ぎます。)

●他の目薬も併用する場合には、5分以上の間隔をあけてから点眼してください。

●ソフトコンタクトレンズを装用している場合は、レンズを外して点眼し、少なくとも5～10分以上経過してからレンズをつけてください。



保存のしかた

- 投薬袋(遮光袋)に入れて、室温(1～30℃)で保存してください。
- 開封後は1ヵ月以内に使用してください。

点眼後の注意

- 副作用として、以下のような症状があらわれることがあります。
症状が続く場合は、医師または薬剤師にご相談ください。
 - ・充血、目の痛み、目の異物感
 - ・目のまわりのかゆみ、腫れ、赤み
 - ・目のまわりが黒ずむ
 - ・まつ毛が長く、太く、多くなる
 - ・黒目(虹彩)の色が濃くなる
 - ・まぶたのくぼみ
 - ・息切れ、息苦しさ
 - ・脈が減る、脈が途切れる
- 点眼後、一時的に目がかすむことがあります。このような場合には機械類の操作や自動車等の運転は控え、症状が回復してから行うようにしてください。
- その他点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

その他

- 5mL容器に2.5mLの薬液が入っているため、液量が少なく見えますが、治療に必要な量は十分入っています。

毎日忘れずに点眼しましょう。

医療機関名



わかもと製薬株式会社