

エピナスチン塩酸塩LX 点眼液0.1%「わかもと」 を使用されている方へ

この目薬は、
アレルギー性結膜炎の治療薬です。
医師または薬剤師の指示どおりにお使いください。



点眼のしかた

- 点眼する前には手をきれいに洗いましょう。
- 1日2回（朝、夕）、1回1滴 点眼してください。
治療期間中は用法・用量どおり点眼しましょう。
点眼するとき、容器の先端が目、まぶた、まつ毛に触れないように注意してください。
- ＜点眼し忘れた場合＞
 - ・気がついたとき、すぐに1回分を点眼してください。
ただし、次に点眼する時間が近い場合には忘れた分は点眼せず、次の点眼時間に1回分を点眼してください。
- 点眼後、目からあふれた目薬は、ぬらしたティッシュ等ですぐにふき取ってください。
- 他の目薬も併用する場合には、5分以上の間隔をあけてから点眼してください。

保存のしかた


- 室温(1~30℃)で保存してください。
- 開封後は、1ヵ月以内に使用してください。

点眼後の注意

- 点眼後に何か異常を感じたときは、すぐに医師または薬剤師にご相談ください。

コンタクトレンズ装用の方へ

- コンタクトレンズを装用している患者さんは、①コンタクトレンズを装用する前、②コンタクトレンズを外した時に点眼しましょう。



指示どおりに点眼しましょう。

医療機関名



わかもと製薬株式会社